FR

MODE D'EMPLOI – MODÈLES HEMA

(À NOTER QUE LES SCHÉMAS MONTRENT UNE LENTILLE BLEUE D'UN SEUL TENANT UNIQUEMENT À DES FINS DE DÉMONSTRATION)

REMARQUE IMPORTANTE

Ce produit est destiné à être utilisé par un chirurgien ophtalmique qualifié dans un cadre médical stérile. Il est fortement recommandé que le chirurgien respecte les recommandations, contre-indications et mises en garde indiquées dans ce mode d'emploi.

DESCRIPTION DU DISPOSITIF

Les lentilles intraoculaires Kompo HEMA fabriquées par Lenstec sont des implants optiques prévus pour remplacer le cristallin de l'œil humain dans la correction visuelle de l'aphakie. Les lentilles intraoculaires HEMA de Lenstec sont fabriquées à partir d'un copolymère acrylique hydrophobe de qualité médicale avec filtre anti-UV polymérisable. Softec HD™ lentilles intraoculaires HEMA Lenstec sont des lentilles à face d'optique sphériques. Softec HD™ lentilles intraoculaires HEMA Lenstec sont fabriquées à l'aide d'optiques biasphériques. Les lentilles intraoculaires HEMA Lenstec sont dotées de bords carrés.

UTILISATION PRÉVUE

Les lentilles intra-oculaires (LIO) de chambre postérieure HEMA de Lenstec sont des implants optiques absorbant les ultraviolets, destinés au remplacement du cristallin de l'œil humain après la retrait de la cataracte par phacoémulsification (Aphakie). Cette lentille est à usage unique et uniquement conçue pour être implantée dans le sac capsulaire.

Les patients doivent avoir rempli l'intégralité des critères suivants pour être éligibles à l'implantation de lentilles :

- Être âgés d'au moins 18 ans
- Homme ou femme
- Peu importe la couleur de la peau
- Capable de fournir le consentement éclairé par écrit

Les lentilles sont conçues pour une implantation primaire lorsque le cristallin a été retiré par phacoémulsification avec capsulotomie larymale circulaire et capsule postérieure intacte.

AVANTAGES CLINIQUES

Les principaux avantages pour la gestion clinique et la santé des patients comprennent le traitement des pathologies suivantes :

- Aphakie
- Cataracte
- Myopie
- Hypermétropie
- Astigmatisme

La durée de l'effet du traitement devrait être permanente

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

Les effets attendus sur la qualité de vie des patients sont la prévention de la perte de la vue et l'amélioration de l'acuité visuelle.

RISQUES

Voici les risques potentiels liés à l'implantation des LIO Lenstec Softec :

Opacification de la capsule postérieure, œdème maculaire cystoïde, DFI élevée, iritis, Dysphotopsie (incluant éblouissement, halos, images fantômes, ombres temporelles), Uvéite (incluant kératouvéite, Vitrite), œdème du stroma cornéen, syndrome d'hyphéma de l'uvéite et du glaucome, décentrage, inclinaison et dislocation de la lentille intraoculaire, fibrine, contraction capsulaire, protéines et déformation du cristallin, synéchies rétro-capsulaires, Hyphéma, Endophtalmite, Hypopion, glaucome et opacification de la capsule postérieure (PCO), segment antérieur (TASS), Dislocation du cristallin, Opacification du matériau de l'implant, Fibrose de la capsule antérieure, Chirurgie concomitante, Capture pupillaire, Excroissance des cellules épithéliales du cristallin, Décentrement, Pli de Descemet, Opacification de la capsule antérieure, Information membromateuse

Les personnes appartenant aux catégories de santé suivantes peuvent courir un risque plus élevé de subir une cellule de cataracte secondaire de la LIO (dépôts de surface sur la lentille) :

- Diabétiques
  - Associés :
    - Décollement de la rétine
    - Décollement du corps vitré
    - Vitrectomie
    - Rétinopathie diabétique
    - Maculopathie diabétique
- Glaucome
- Ayant subi une greffe endothéliale DMEK ou DSEK (plusieurs procédures augmentent encore le risque)
- Hypertension
- Cholestérol élevé

CONTRE-INDICATIONS

Les contre-indications spécifiques suivantes s'appliquent en plus des contre-indications générales de toute intervention oculaire :

Glaucome non contrôlé, microphtalmie, uvéite chronique grave, diathèse hémorragique, dégénérescence cornéenne, rétinopathie diabétique, atrophie de l'iris, complications péri-opératoires, éventuelles complications postopératoires préexistes et autre lentille cristallinienne ou chirurgie d'après la pose primaire.

MISES EN GARDE

Le chirurgien responsable de l'implantation doit tenir compte des mises en garde suivantes et évaluer le rapport avantages/risques avant l'intervention :

1. Le non-respect des instructions d'implantation accompagnant cette lentille risque d'entraîner une mauvaise manipulation et d'endommager la LIO avant ou pendant l'implantation.
2. Aucune donnée clinique ne vient étayer la mise en place de cette lentille dans le sillon ciliaire.
3. Il convient de limiter l'ouverture de la capsulorhexie postérieure à 4 mm environ. Ainsi que pour d'autres LIO, il existe un risque accru de dislocation de la lentille et/ou de nouvelle intervention chirurgicale secondaire lors de capsulotomies au YAG précoces ou élevées.
4. Il ne convient pas d'implanter la lentille intraoculaire de la série Make de Lenstec si la capsule postérieure n'est pas intacte ou en présence d'une rupture/déhiscence zonulaire importante.
5. L'efficacité des lentilles absorbant la lumière ultraviolette à réduire l'incidence des troubles rétiniens n'a pas été prouvée. À titre de précaution, il convient d'informer les patients qu'ils devront porter des lunettes de soleil avec protection UV en cas d'exposition au soleil.
6. Le taux d'endothélite maculaire cystoïde peut augmenter avec la mise en place de lentilles dans le sillon ciliaire.
7. Les patients répondant aux critères suivants peuvent être exposés à un risque accru de complications après implantation d'une LIO de la série HEMA de Lenstec : intervention chirurgicale oculaire antérieure, patient présentant l'un des facteurs cités dans la section « Contre-indications » de ce document, cataracte ou trouble de la fonction visuelle autre que celle à l'œil ciblé par la cataracte, atrophie de l'iris, arésilience grave, hémorragie oculaire, dégénérescence maculaire ou suspicion d'infection microbienne.
8. Les patients faisant état de complications lors du traitement de l'extraction de la cataracte ou présentant une exposition à un risque accru de complications après implantation d'une LIO de la série HEMA de Lenstec. Ces complications incluent notamment : saignement persistant, lésions significatives de l'iris, pression positive non contrôlée, prolapsus ou perte de vitreux de l'œil ciblé.
9. L'implantation de lentilles intraoculaires peut affecter de manière délétère la capacité du chirurgien à observer, diagnostiquer ou traiter autrement les maladies du segment postérieur par la suite.
10. Les patients présentant une déformation de l'œil due à un traumatisme antérieur ou des défauts de développement ne permettant pas un support approprié de la LIO peuvent présenter un risque accru de complications après l'implantation de la série HEMA de Lenstec.
11. Les patients présentant des inflammations sévères récurrentes du segment antérieur ou postérieur ou une uvéite peuvent présenter un risque accru de complications après l'implantation de la série HEMA de Lenstec.
12. Il convient d'éviter toute circonstance pouvant être à l'origine de lésions sur l'endothélium cornéen pendant l'implantation.
13. Il est strictement interdit de réutiliser la LIO ou risque d'entraîner des graves risques d'infection.
   - Lenstec ne fournit pas de consignes de nettoyage/stérilisation. Une LIO mal nettoyée et/ou mal stérilisée de nuire considérablement à la vision du patient, notamment du fait d'une infection par contamination croisée.
   - Une fois sortie de son emballage d'origine, la LIO perd sa tragilité. Si une LIO vient à être endommagée, l'utilisateur risque d'ignorer sa date d'expiration, son numéro de série ou sa puissance dioptrique.
   - En cas de réutilisation de la lentille, Lenstec ne garantit ni la fonctionnement adéquat des parties haptiques ou optiques. Un défaut de l'un de ces composants risque de rendre la LIO inefficace.

PRÉCAUTIONS

- Ne pas stériliser à l'autoclave et ne pas restériliser la lentille. Les lentilles ayant besoin d'être stérilisées devront être retournées à Lenstec.
- Ne pas utiliser ce dispositif si l'emballage stérile a été endommagé ou présente de traces de fuite sur le flacon ou sur le sac.
- Ne pas faire tremper la lentille intraoculaire dans une solution autre qu'une solution saline équilibrée et stérile.
- La lentille doit être utilisée immédiatement après ouverture de l'emballage stérile et la lentille peut lui faire absorber des substances avec lesquelles elle entre en contact, telles que des désinfectants, des médicaments, des cellules sanguines, etc. pouvant alors provoquer un « syndrome de la lentille toxique ». Rincer soigneusement la lentille avant de l'implanter.
- La lentille doit être implantée dans les 2 minutes suivant sa sortie de la solution saline, car la déshydratation en fragilise le matériau.
- La lentille doit être implantée dans la poche capsulaire.
- Ne pas utiliser la lentille intraoculaire après la date d'expiration indiquée sur l'étiquette à l'extérieur de l'emballage. Passé cette date, Lenstec ne peut garantir que les performances de la LIO resteront inchangées.
- Manipuler la lentille avec précaution. Une manipulation brusque ou excessive peut endommager la lentille.
- Le chirurgien doit être conscient du risque d'opacification de la lentille intraoculaire, qui peut nécessiter le retrait de la lentille. REMARQUE: La lentille intraoculaire hydrophile Lenstec n'a pas d'antécédents d'opacification liée au matériau primaire, comme cela a été vu avec certaines lentilles d'autres fabricants! La matériau utilisé par Lenstec, contrairement à celui utilisé par d'autres fabricants, n'a fait l'objet d'aucun rapport d'événements indésirables primaires dus à la décoloration du matériau. Les opacifications observées dans d'autres différences liées au matériau, comprises pour avoir causé des problèmes postopératoires. Les chirurgiens ophtalmologistes doivent garder à l'esprit qu'il y a également de rares cas d'opacification secondaire des LIO hydrophiles. Nécessaire de consulter ces cas et nécessite une explication.
- Les patients dont la barrière hémato-oculaire est fragilisée sont plus à même de subir des dépôts sur la lentille susceptibles d'entraîner son retrait.
- Tous les cas de réaction secondaire doivent être signalés à Lenstec.
- Les établissements médicaux utilisant cette LIO et ses accessoires (ce cas échéant) doivent assurer l'élimination appropriée des ustensiles, en tant que déchets médicaux.

CALCUL DE LA PUISSANCE DE LA LENTILLE

Il est recommandé au chirurgien d'utiliser la méthode de calcul de la puissance qu'il connaît le mieux. En règle générale, la puissance de la lentille adaptée à chaque patient peut être calculée à partir des mesures de kératométrie et de la longueur axiale de l'œil selon des formules disponibles dans la documentation publiée. Des références supplémentaires sur ce sujet sont disponibles à l'adresse http://www.lenstec-ltd.com/o-masterlens_constants.html.
REMARQUE : La constante 'A' et les valeurs ACD imprimées sur la partie extérieure de l'emballage ne sont que des estimations. Il est recommandé que le chirurgien détermine ses propres valeurs sur la base de son expérience clinique personnelle.

MODE D'EMPLOI

La lentille intraoculaire HEMA de Lenstec, Inc. est stérilisée à l'autoclave dans un flacon inclus dans un sac détachable hermétique en Tyvek. La lentille est maintenue dans un système de distribution en plastique qui est stérilisé suite à 5 à 7 cycles à l'autoclave (ou suffisant pour stériliser sauf si le sceau de Tyvek a été ouvert ou endommagé). Exécutez le solution standard de phacoémulsification. Vérifiez que le diamètre du capsulorhexis va jusqu'à 5.5 mm. Avant l'implantation, vérifiez le type de LIO, sa puissance et sa date d'expiration sur l'emballage. La lentille peut être introduite par insertion après pliage ou par injection.
REMARQUE : Il convient de n'utiliser que les instruments injectors agréés pour la lentille intraoculaire HEMA de Lenstec.

- Préparez une cartouche d'injecteur (A) avec la substance viscoélastique en ouvrant les rabats de la cartouche et en injectant la substance viscoélastique sur chaque côté de la chambre et sur la cible entre les canaux (E).
- Prenez l'injecteur (C) en vérifiant que la pointe est ouverte et utilisez l'applicateur (B) pour insérer la pointe en silicone sur la pointe du piston (F), puis tirez sur le piston le plus loin possible.
- Retirez le flacon de la lentille (G) du sac détachable en Tyvek. Maintenez fermement le flacon d'une main et dévissez le capuchon. Retirez le bouchon, puis le système de mise en place à l'aide d'une pince (H). Faites attention lors du retrait du système de mise en place, car il peut rester de l'eau à l'intérieur. Vérifiez l'absence de débris et de dommages sur la lentille. Maintenez fermement le système de mise en place d'une main et saisissez le piston de l'autre main afin de positionner le dispositif pour plier la lentille. Retirez le piston pour libérer les ressorts de la lentille (I). A l'aide du système de mise en place, saisissez la lentille du système de mise en place et placez-la entre les ressorts sur le côté de l'optique (et non pas haptique). Placez la lentille sur la cartouche et vérifiez que l'orientation de la lentille correspond bien à celle du schéma (J).
- Au moyen d'une pince double stérile, comprimez doucement la lentille (y compris les deux haptiques et la totalité de l'optique) dans la chambre de la cartouche en dessous du niveau des rabats.
- Fermez lentement la cartouche, en maintenant une petite pression sur la partie optique avec la prise et en vérifiant que les parties optiques et haptiques ne sont pas coincées dans les rabats lors de la fermeture de la cartouche. Inspectez visuellement que la lentille n'est pas pliée avant d'insérer la cartouche dans l'injecteur. Insérez fermement le piston de l'applicateur de la lentille à l'arrière de la chambre fermée de la cartouche (D, K) et faites avancer lentement la lentille depuis la chambre jusqu'au bambet (vérifiez l'absence de résistance, celle-ci pouvant endommager la lentille et/ou gêner son déploiement dans le sac capsulaire). Vérifiez que la lentille ne peut plus avancer de manière à ce que la lentille ne soit pas pincée dans la pointe. La lentille doit pouvoir bouger librement. Si ce n'est pas le cas, l'un ou les deux haptiques (ou l'optique) sont pincés dans les rabats de la cartouche. Si la lentille ne bouge pas librement, l'injecteur doit être retiré et recommencé cette étape. Si la lentille bouge librement, la cartouche est prête à charger dans l'injecteur. REMARQUE : LA NON-VÉRIFICATION DE LA MISE EN PLACE CORRECTE DES HAPTIQUES OU DE L'OPTIQUE DE LA LENTILLE PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES AU MOMENT DE L'INJECTION/IMPLANTATION.
- Placez la cartouche dans le corps (L) de l'injecteur et poussez-la à fond. Appuyez sur le piston de l'injecteur de sorte que la pointe en silicone s'adapte à l'arrière de la chambre de la cartouche et fermez le levier jusqu'à ce que vous sentiez un point d'arrêt.
- Introduisez soigneusement la pointe de l'injecteur chargé dans la chambre antérieure avec le biseau tourné vers le bas pour éviter de toucher l'endothélium, jusqu'à ce que l'ouverture de la cartouche ait dépassé le bord de la pupille. Injectez doucement la lentille (M) dans la chambre antérieure. Au besoin, faites tourner l'injecteur dans le sens antihoraire pour garantir que la LIO reste correctement orientée le long de l'axe de la fente. Si la lentille commence à se replier à l'intérieur de la cartouche, retirez-la et recommencez cette étape. Si la lentille bouge librement, la cartouche est prête à charger dans l'injecteur. REMARQUE : LA NON-VÉRIFICATION DE LA MISE EN PLACE CORRECTE DES HAPTIQUES OU DE L'OPTIQUE DE LA LENTILLE PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES AU MOMENT DE L'INJECTION/IMPLANTATION.
- Placez la cartouche dans le corps (L) de l'injecteur et poussez-la à fond. Appuyez sur le piston de l'injecteur de sorte que la pointe en silicone s'adapte à l'arrière de la chambre de la cartouche et fermez le levier jusqu'à ce que vous sentiez un point d'arrêt.
- Introduisez soigneusement la pointe de l'injecteur chargé dans la chambre antérieure avec le biseau tourné vers le bas pour éviter de toucher l'endothélium, jusqu'à ce que l'ouverture de la cartouche ait dépassé le bord de la pupille. Injectez doucement la lentille (M) dans la chambre antérieure. Au besoin, faites tourner l'injecteur dans le sens antihoraire pour garantir que la LIO reste correctement orientée le long de l'axe de la fente. Si la lentille commence à se replier à l'intérieur de la cartouche, retirez-la et recommencez cette étape. Si la lentille bouge librement, la cartouche est prête à charger dans l'injecteur. REMARQUE : LA NON-VÉRIFICATION DE LA MISE EN PLACE CORRECTE DES HAPTIQUES OU DE L'OPTIQUE DE LA LENTILLE PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES AU MOMENT DE L'INJECTION/IMPLANTATION.
- Introduisez soigneusement la pointe de l'injecteur chargé dans la chambre antérieure avec le biseau tourné vers le bas pour éviter de toucher l'endothélium, jusqu'à ce que l'ouverture de la cartouche ait dépassé le bord de la pupille. Injectez doucement la lentille (M) dans la chambre antérieure. Au besoin, faites tourner l'injecteur dans le sens antihoraire pour garantir que la LIO reste correctement orientée le long de l'axe de la fente. Si la lentille commence à se replier à l'intérieur de la cartouche, retirez-la et recommencez cette étape. Si la lentille bouge librement, la cartouche est prête à charger dans l'injecteur. REMARQUE : LA NON-VÉRIFICATION DE LA MISE EN PLACE CORRECTE DES HAPTIQUES OU DE L'OPTIQUE DE LA LENTILLE PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES AU MOMENT DE L'INJECTION/IMPLANTATION.
- Saque el frasco con la lente (G) del sobre pelable de Tyvek. Sujete firmemente el frasco con una mano y desenrosque la tapa. Quite el tapón y saque el sistema de suministro con unas pinzas (H). Tenga mucho cuidado al sacar el sistema de suministro, la lente se daña con facilidad. Compruebe que la lente no esté sucia o dañada. Sujete con fuerza el sistema de suministro con una mano, y el émbolo con la otra para posicionar la lente. Retire el émbolo para plegar la lente. Retirar el émbolo (I) hace que los muelles de la lente se liberen. Con una pinzas, extraiga con cuidado la lente del sistema de suministro, procurando sujetarla por la parte óptica (no por los hápticos). Coloque la lente en el cartucho procurando orientarla correctamente (ver ilustra en el diagrama J).
- Usando unas pinzas en ángulo estériles parcialmente abiertas, comprima suavemente la lente (incluidos ambos hápticos y toda la parte óptica) para introducirla en la cámara del cartucho por debajo del nivel de los alerones.
- Cierre el cartucho despacio; apretando suavemente al mismo tiempo la parte óptica con las pinzas, y procurando que la parte óptica y los hápticos no queden atrapados entre los alerones del cartucho al cerrarse. Examine el cartucho cerrado para asegurarse de que la lente no haya quedado atrapada entre los alerones. Introduzca el extremo del émbolo del cargador de la lente por el extremo del cartucho cerrado (K, N), y empuje lentamente la lente para pasarla de la cámara al cartón (con cuidado para no pasar la lente más allá del cartón). Si la lente se daña durante el proceso, o parece que no está correctamente colocada, tírela y coloque una nueva lente. Compruebe una vez más que la lente no haya quedado atrapada en los alerones. Introduzca el extremo del cartucho (L) en el extremo del inyector (M). Empuje el émbolo del inyector para cargar la lente en el inyector. NOTA: SI LA PARTE ÓPTICA DE LOS HÁPTICOS NO ESTÁN CORRECTAMENTE COLOCADOS NO CARTUCHO, PODERÁ OCORRER DANOS DURANTE A INYECCIÓN/ IMPLANTACIÓN.
- Tutti i casi è riconosciuta della lente devono essere segnalati a Lenstec.
- Le strutture mediche che utilizzano questi impianti e i loro accessori (se presenti) devono assicurare uno smaltimento corretto come rifiuto medico.

CALCOLO DELLA POTENZA DELLE LENTI

Il chirurgo deve preferibilmente utilizzare il metodo di calcolo della potenza con cui ha maggiore dimestichezza. In generale, è possibile calcolare la potenza della lente per ciascun paziente mediante le misurazioni cheratometriche e la lunghezza assiale dell'occhio secondo formule disponibili nella letteratura pubblicata. Per ulteriori informazioni su questo argomento, visitare il sito Web http://www.lenstec-ltd.com/o-masterlens_constants.html.
NOTA: i valori della costante 'A' e ACD stampati all'esterno della confezione sono valori approssimativi. Il chirurgo deve preferibilmente determinare i valori da utilizzare sulla base della propria esperienza clinica.

ISTRUZIONI PER L'USO

Tutte le lenti intraoculari Lenstec HEMA sono sterilizzate in autoclave in un flacone posto all'interno di un sacchetto in Tyvek sigillato. Se la lente è immersa in una soluzione salina allo 0,9% sterile, all'interno di un sistema di erogazione in plastica. Il contenuto del sacchetto o flacone è sterile solo se la confezione non è danneggiata o aperta. Utilizzare tecniche di chirurgia della cataratta standard. Verificare che il diametro capsulorhexis sia di 5,5 mm circa. Prima di procedere all'impianto, controllare il tipo di LIO, la potenza e la data di scadenza. Il tipo e la potenza della LIO, l'ortotil sulla confezione della lente. La lente può essere introdotta tramite inserimento, dopo essere stata piegata, o mediante iniezione, seguendo le istruzioni fornite di seguito.
NOTA: utilizzare esclusivamente strumenti di posizionamento delle lenti approvati per l'impianto delle lenti intraoculari Lenstec HEMA.

- Preparare una cartuccia di iniezione (A) con soluzione viscoelastica aprendo le alette della cartuccia e iniettando la soluzione viscoelastica su ciascun lato della camera e sulla spongiera fra i canali (E).
- Prendere l'iniettore (C), controllando che la punta del polo stantuffo funziona, e utilizzare l'applicatore (B) per fissare la punta di silicone sulla punta dello stantuffo (F) e quindi ritrarre lo stantuffo fin quando è possibile.
- Estrarre il flacone contenente la lente (G) dal sacchetto in Tyvek. Tenere saldamente il flacone con una mano e svitare il tappo. Togliere il tappo ed estrarre il sistema di erogazione con una pinza chirurgica (H). Estrarre il sistema di erogazione con cautela, per evitare di danneggiare la lente. Verificare che la lente non sia sporca né danneggiata. Tenere saldamente il sistema di erogazione con una mano e con l'altra afferrare lo stelfo per posizionare il dispositivo per il piegamento della lente. Ritrarre lo stantuffo per rilasciare i fermi della lente (I). Utilizzare una pinza chirurgica per estrarre la lente dal sistema di erogazione, facendo attenzione a prenderla dalla parte ottica (e non dalle anse). Posizionare la lente nella cartuccia, assicurandosi che sia orientata correttamente (vedere lo schema (J)).
- Utilizzando un paio di pinze ad angolo sterili parzialmente aperte, spingere con delicatezza la lente (inclusi le anse e l'intera parte ottica) nella camera della cartuccia sotto il livello delle alette.
- Chiudere lentamente la cartuccia, mantenendo una leggera pressione sulla parte ottica con la pinza e assicurandosi che le parti ottiche e le anse non restino schiacciate nelle alette della cartuccia mentre questa viene chiusa. Esaminare la cartuccia chiusa per accertarsi che la lente non resti bloccata dalle alette. Introdurre lo stantuffo del dispositivo di caricamento nella parte posteriore della cartuccia chiusa (D, K) e spingere lentamente la lente nella camera anteriore (M), facendo attenzione a non farla passare oltre il cartone (in modo che la lente sia rimasta bloccata dalle alette). Accertarsi che il dispositivo di caricamento venga fatto avanzare alla profondità massima, in modo che la lente si trovi nella punta (ogni). Se la lente non si muove liberamente, la cartuccia è pronta per essere caricata nell'iniettore. In caso contrario, le anse e/o la parte ottica restano schiacciate dalle alette della cartuccia. Spingere il dispositivo di caricamento, estrarre la cartuccia e ripetere questa fase della procedura. Se la lente si muove liberamente, la cartuccia è pronta per essere caricata nell'iniettore. NOTA: LA MANCATA VERIFICA DEL CORRETTO POSIZIONAMENTO DELLA CARTUCCIA DELLE ANSE O DELLA PARTE OTTICA PUÒ CAUSARE DANNI DURANTE L'INIEZIONE/IMPIANTO.
- Posizionare la cartuccia nell'alloggiamento (L) dell'iniettore e spingere fino in fondo. Spingere lo stantuffo in modo che la punta di silicone entri nella parte posteriore della camera della cartuccia e chiudere il meccanismo a leva fino a quando non si avverte un punto non resistivo.
- Introdurre la punta dell'iniettore carico nella camera anteriore, con la punta smussata rivolta verso il basso per evitare di toccare l'endotelio, fino a quando l'apertura della cartuccia non superi il margine pupillare distale. Iniettare delicatamente la lente (M) nella camera anteriore. Se necessario, ruotare l'iniettore in senso antiorario per mantenere il corretto orientamento della lente lungo l'asse della fessura. Se la lente comincia a ripiegarsi all'interno della cartuccia, estrarla e ripetere questa fase. Se la lente si muove liberamente, la cartuccia è pronta per essere caricata nell'iniettore. NOTA: LA MANCATA VERIFICA DEL CORRETTO POSIZIONAMENTO DELLE ANSE O DELLA PARTE OTTICA DELLA LENTE PUÒ CAUSARE DANNI DURANTE L'INIEZIONE/IMPIANTO.

FECHA DE CADUCIDAD

La fecha de caducidad que figura en el paquete de la lente es la fecha de caducidad de la esterilidad. No use la LIO pasada la fecha de caducidad.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES

Póngase en contacto con el representante de Lenstec para saber cuál es la política relativa a la devolución de productos. Devuelva la lente con todos sus datos de identificación y explique el motivo de la devolución. Etiquete el paquete de la devolución como de riesgo biológico.

RESUMEN DEL RENDIMIENTO MÉDICO Y DE SEGURIDAD

El Resumen sobre seguridad y funcionamiento clínico (RSFC) se encuentra disponible en la base de datos europea sobre productos sanitarios (EUDAMED) con un enlace al UDI BÁSICO. Se puede acceder a sitio web de EUDAMED en https://ec.europa.eu/tools/eudamed.

REGISTRO DE PACIENTES Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN

En el paquete se incluye una tarjeta de identificación del paciente. Esta tarjeta debe rellenarse y entregarse al paciente, y se le debe indicar que la conserve como registro permanente y se la enseñe a cualquier médico que pueda atenderle en el futuro. También se proporcionan etiquetas adicionales de identificación de la lente para colocarlas en la tarjeta de identificación del paciente y otros documentos de la historia clínica.

Los acontecimientos adversos/quejas que razonablemente puedan considerarse como relacionados con la lente y cuya notificación, gravedad o grado de incidencia no se prevean con anterioridad deben notificarse al Organismo competente o la Autoridad Competente del Estado miembro de la UE y a Lenstec, en Airport Commercial Centre, Pilgrim Road, Christ Church, Barbados: Tel: +1 246-420-6795 • Fax: +1 246-420-6797. Email: feedback@lenstec.com, o bien póngase en contacto con su representante de Lenstec.

BIBLIOGRAFÍA (O

TARJETA DE IMPLANTE

- Todos los campos presentes en la tarjeta de identificación deben ser completados por la institución / proveedor de atención médica.
- Es responsabilidad de la institución / proveedor de atención médica pegar la etiqueta autoadhesiva con el logotipo de "LENSTEC" grabado en el reverso (sin imprimir) de la tarjeta de identificación del paciente, y proporcionársela al paciente como un registro de su implante.

IT

ISTRUZIONI PER L'USO - MODELLI HEMA

(LE ILLUSTRAZIONI MOSTRANO UNA LENTE MONOPEZZO BLU SOLO A SCOPO DIMOSTRATIVO)

AVVISO IMPORTANTE

Questo prodotto è destinato all'uso in un ambiente medico sterile da parte di un chirurgo oftalmico qualificato. Si invita il chirurgo a rispettare le raccomandazioni, controindicazioni e avvertenze riportate nelle presenti istruzioni.

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

Le lenti intraoculari HEMA prodotte da Lenstec sono impianti ottici in grado di assorbire i raggi ultravioletti. Sono destinate alla sostituzione del cristallino umano per correggere i difetti visivi dovuti all'afachia. Le lenti Lenstec HEMA sono prodotte con un copolimero acrilico idrofobo di qualità medica con filtro UV polimerizzabile. Softec HD™ lenti intraoculari HEMA Lenstec hanno ottiche sferiche. Softec HD™ lenti intraoculari HEMA Lenstec hanno ottiche biasferiche. Le lenti intraoculari HEMA Lenstec hanno bordi quadrati.

USO PREVISTO

Le lenti intraoculari (IOL) Softec HD™ con ottica a piano convesso per l'impianto nella camera posteriore sono impianti che assorbono la radiazione ultravioletta, concepiti per la sostituzione del cristallino dell'occhio umano in seguito alla facoemulsificazione per rimozione della cataratta (Afachia). Le lenti sono solo monouso e sono indicate per il posizionamento nel sacco capsulare.

I pazienti che soddisfano tutti i criteri che seguono devono essere considerati idonei per l'impianto:

- 18 anni o più
- Maschio o femmina
- Qualsiasi colore
- Capacità di fornire il consenso all'intervento in forma scritta

Le lenti sono indicate come impianto primario quando una lente con cataratta è stata rimossa mediante facoemulsificazione con capsulotomia a strappo circolare e la capsula posteriore intatta.

VANTAGGI CLINICI

I vantaggi principali per la gestione clinica e la salute del paziente includono il trattamento di:

- Afachia
- Cataratta
- Miopia
- Ipermetropia

Si anticipa che la durata dell'effetto del trattamento è permanente.

CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI

Gli effetti anticipati sulla qualità della vita del paziente sono la prevenzione della perdita della vista e una migliore acuità visiva.

RISCHI

I rischi potenziali dell'impianto delle lenti intraoculari della serie Lenstec Softec sono i seguenti:

Opacificazione della capsula posteriore, edema maculare cistoide, pressione intraoculare alta, iride, dislocazione dell'iride, afachia, aloni, immagini sdoppiate, ombre, percezione anomala di luci, distorsione della visione, dislocazione e inclinazione della lente intraoculare, fibrina, contrazione capsulare, proteine e deformazione del cristallino, sinechie retrocapsulari, Ipema, Endoftalmite, Ipopion, glaucoma e opacificazione della capsula posteriore (PCO), segmento anteriore (TASS), dislocazione del cristallino, opacificazione del materiale dell'impianto, fibrosi della capsula anteriore, chirurgia concomitante, cattura pupillare, epitelio del cristallino cresciuto cellular, desincentramento, pliegues de Descemet, opacificazione della capsula anteriore, infiammazione membranosa

Le persone con le seguenti categorie da salud pueden tener un mayor riesgo de experimentar una calcificación secundaria de la LIO (depósitos en la superficie del cristalino):

- Diabetici
  - Associato:
    - Desprendimiento de retina
    - Desprendimiento de vítreo
    - Vitrectomía
    - Retinopatía diabética
    - Maculopatía diabética
- Glaucoma
- Se somette a DMEK o DSEK (varios procedimientos aumentan aún más el riesgo)
- Ipertensione
- Colesterol alto

CONTRAINDICAZIONES

Además de las contraindicaciones de carácter general de la cirugía ocular, se incluyen las siguientes contraindicaciones específicas:

Glaucoma mal controlado, microftalmia, uveítis crónica grave, degrado / degrendimiento de retina, descompensación corneal, retinopatía diabética, atrofia del iris, complicaciones perioperatorias, posibilidad de posibles complicaciones postoperatorias y cualquier otro trastorno que un oftalmólogo pudiera determinar basándose en su experiencia.

AVVERTENZE

Attenersi alla determinazione in relazione entre los riesgos y los beneficios de la intervención, el cirujano que realice el implante debe tener en cuenta las siguientes advertencias:

1. Se un seguen las instrucciones de implantación de la lente durante la manipulación de forma incorrecta con el consiguiente riesgo de dañar la LIO antes o durante el implante.
2. No existen datos clínicos que avalen la colocación de esta lente en el sulcus ciliar.
3. Cualquier abertura de la capsulotomía posterior debe ser como máximo de unos 4 mm. Como ocurre con otras LIO, una capsulotomía con láser YAG demasiado amplia o prematura aumenta el riesgo de dislocación de la lente y de reintervención quirúrgica secundaria.
4. Las lentes intraoculares de la serie HEMA de Lenstec no se deben implantar si el saco capsular no está intacto, o si hay alguna rotura o dehiscencia zonular importante.
5. Aun no se ha demostrado la eficacia de las lentes que absorben la luz ultravioleta para reducir la incidencia de alteraciones retinianas. Como medida de precaución, se debe explicar a los pacientes que deben llevar gafas de sol con protección ultravioleta cuando se expongan a la luz del sol.
6. La incidencia de endotelitis macular quística puede aumentar a los hápticos en sulcus ciliar.
7. Los pacientes que presentan alguna de las siguientes características podrían tener mayor riesgo de complicaciones tras el implante de cualquier LIO de la serie HEMA de Lenstec: cirugía intraocular anterior, cualquier factor de riesgo de los incluidos en la sección «Contraindicaciones» de este documento, catarata o trastorno de la función visual distinto de la catarata del ojo diana, atrofia del iris, arresilencia grave, hemorragia ocular, degeneración macular o sospecha de infección microbiana.
8. Los pacientes que presentan complicaciones durante la extracción de la catarata o que presentan un riesgo elevado de complicaciones tras el implante de cualquier LIO de la serie HEMA de Lenstec. Entre ellas se pueden incluir: hemorragia persistente, lesiones importantes del iris, presión positiva mal controlada y prolapso o pérdida importante de vítreo.
9. Debe determinarse si el implante de la lente intraocular puede afectar negativamente a la capacidad del cirujano para observar, diagnosticar o tratar otras afecciones del segmento posterior del paciente.
10. Se debe valorar si es conveniente implantar una LIO de la serie HEMA de Lenstec en pacientes que presenten una distorsión del ojo debido a un traumatismo previo o a un defecto durante el desarrollo que impida sujetar adecuadamente la LIO.
11. Se debe valorar si es conveniente implantar una LIO de la serie HEMA de Lenstec en pacientes con uveítis o inflamación recurrente grave del segmento anterior o posterior.
12. Debe evitarse cualquier circunstancia susceptible de producir una lesión del endotelio corneal durante la implantación.
13. Está estrictamente prohibido reutilizar la LIO, ya que podría plantear problemas importantes de seguridad y eficacia.
   - Lenstec no proporciona instrucciones de limpieza o esterilización. Una LIO que no se haya limpiado o esterilizado correctamente puede dañar gravemente la visión del paciente, debido en parte a la transmisión de infecciones.
   - Una vez fuera del envase original se puede perder la tragilidad de la LIO, y en caso de reutilizarse, no es probable que el usuario conozca la fecha de caducidad correcta, el número de serie o la potencia dióptrica.
   - Si la LIO se reutiliza, Lenstec no puede garantizar la estabilidad ni el correcto funcionamiento de los hápticos o de la parte óptica. Un fallo de cualquiera de estos componentes puede comprometer la eficacia de la LIO.

PRECAUCIONES

- No utilice un autoclave ni intente reesterilizar la lente. Las lentes que haya que reesterilizar deben enviarse a Lenstec.
- No utilice el dispositivo si el envase estéril ha sufrido daños o si hay signos de fuga en el frasco o en el sobre.
- No meja la lente intraocular con ninguna solución que no sea solución salina equilibrada estéril.
- Una vez abierto el paquete, hay que usar la lente intraocular inmediatamente. Por su naturaleza hidrófila, la lente puede absorber sustancias con las que entre en contacto, como por ejemplo desinfectantes, medicamentos, células sanguíneas, etc. Esto puede provocar un "síndrome de lente tóxica". Enjuague cuidadosamente la lente antes de la implantación.
- Una vez extraída del baño de solución salina, la lente debe implantarse antes de 2 minutos, ya que la deshidratación hace que el material de la lente se vuelva quebradizo.
- La lente debe implantarse en el saco capsular.
- No use la lente intraocular pasada la fecha de caducidad que figura en la etiqueta exterior del envase. Después de esta fecha, Lenstec no puede garantizar que el rendimiento de la lente intraocular permanezca inalterado.
- Manipule la lente con cuidado. Una manipulación excesiva o brusca puede dañar la lente.
- El cirujano debe ser consciente del riesgo de opacificación de la lentina intraocular, que puede requerir la extracción de la lente. NOTA: La lente intraocular hidrófila Lenstec no tiene antecedentes de opacificación relacionada con el material primario, como se ha visto con ciertas lentes de otros fabricantes! El material utilizado por Lenstec, a diferencia del utilizado por otros fabricantes, no ha tenido ningún "Acontecimiento Adverso" primario debido a la decoloración del material, opacificación y otras deficiencias relacionadas con el material, que se sepa que han causado problemas postoperatorios. Los cirujanos oftálmicos deben tener en cuenta que también ha habido casos de opacificación secundaria de LIO hidrófilas del otro. Hombre de estos casos requieren explanación.
- Los pacientes con deterioro de la barrera hematoacuosa pueden tener más probabilidades de que se formen depósitos en la lente, lo cual podría hacer necesario extraer la lente.
- Todos los casos de extracción de la lente deben notificarse a Lenstec.
- Las instalaciones médicas que utilicen esta LIO, y sus accesorios (de corresponder), deben asegurarse de su correcta eliminación como desechos médicos.

CÁLCULO DEL PODER DE LA LENTE

Siempre es conveni

- Έχει την ευθύνη για την κλινική διαχείριση και την υγεία του ασθενούς περιλαμβάνοντα τη θεραπεία των ίδιης παθήσεων:
  - Αφακία
  - Καταρράκτης
  - Μυωπία
  - Υπερμετρωπία

Η διάρκεια του κύκλου ζωής της θεραπείας αναμένεται να είναι μόνιμη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα στην πλειοψηφία της ομάδας ασθενούς είναι η πρόληψη της απώλειας όρασης και η βελτιωμένη όπτική άμβλυνση.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Η πλέον κύκλινδρο από την εμφύτευση των ενδοφακών Lentec Softec Series είναι οι εξής:

Θόλωση του οπίσθιου περιφερικού κυτταρικές σάτιρας της κάψουλας ακόμη, αυξημένη ΕΟΠ, αιτία διαδρομών ενδοφθάλμιας φλεγμονής, οίδημα κερατοειδούς, επανεπιπολαιοποίησης ΙΟΛ, ενδοφθαλμίτιδα, βλάβη κυρίως όρασης, τελική ανάρμοση προσθίου τμήματος (TASS), εκτόπιση κρυσταλλοειδούς φακού, θόλωση υλικού εμφυτεύματος, λωρίδι προθίου περιφερικου, συνοδός χειρουργικό επεμβατη, κορακς εγκλεισμος

Τα σπανιο και ακόλουθα κατηγοριών γνώσις ενδέχεται να διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο διατρητικούς ασβεστοποίησης του ΙΟΛ (επιφανειακές εναποθέσεις στο φακό):

- Διαβήτης:
  - Σχετίζουνε:
    - Αναπτύσσει αμφιβληστροειδούς
    - Αποκόλληση υαλοειδούς σώματος
    - Υαλοειδαιτιδ
    - Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια
    - Διαβητική ωχρωπάθεια
- Γλαύκωμα
- Υπερβολές σε DMEK ή DSEK (πολλαπλές διαδικασίες χωρίς αύξηση του κινδύνου)
- Υπέρταση
- Υψηλή χοληστερόλη

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Εκτός από τις γνωστές αντενδείξεις για οφθαλμική εγχείρηση, σύμφωνα με παραδοτέα συγκεκριμένες αντενδείξεις:
Μη ελεγχόμενο γλαύκωμα, μικροφθαλμός, χρόνια σοβαρή φλεγμονώδης ρηγματοποίηση του αμφιβληστροειδούς χιτώνα, ανεπάρκεια του κερατοειδούς χιτώνα, διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, μέσης ή μεγάλης προεγχειρητικές επιπλοκές, πάθος σπασμένης μεμβράνης ακόμα και μετά από καταστάσεις της οπίσω μοίρας του περιφερικού ένας οφθαλμολογικός χειρουργός, σύνδρομο με την πάροδο του χρόνου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ο οφθαλμίατρος χειρουργός που ασκεί την εμφύτευση πρέπει να λάβει υπόψη τις ακόλουθες προειδοποιήσεις, και να προειδοποιεί την αναλογία κινδύνου / οφέλους πριν από την εγχείρηση:

1. Εάν δεν πρόθυμοι οι οδηγίες εμφύτευσης που παρέχονται με το φακό, ενδέχεται να προκύψει κατά μήκος μετατόπιση και επακόλουθη ζημιά στον φακό πριν ή κατά την εμφύτευση.
2. Δεν υπάρχουν κλινικά δεδομένα που να υποστηρίζουν την τοποθέτηση αυτού του φακού στην άθραυστη σάκκου.
3. Το άνοιγμα ενισχυμένης οπτικής κόμης πρέπει να περιοριστεί από 4 mm περίπου. Όπως συμβαίνει με άλλους ενδοφθάλμιους φακούς, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκτόπισης του φακού ή και διατρυπώσεως φαγοκυττάρωσης μέσα με τραυματισμό ή μεγάλες οπτικές κόμης YAG.
4. Ο ενδοφθάλμιος φακός HEMA δεν πρέπει να εμφυτεύεται σε ή σάκκο της κάψας δεν είναι άθικτος ή εάν υπάρχει ρήξη ιδιαιτέρης στην ακεταλή ζώνη.
5. Δεν έχει καθορισθεί η αποτελεσματικότητα αρνών απορρόφησης της ακόλουθης ρήξη μετά τραυματικών ανθίσεων και μεγάλης καταστάσεις της οπίσω μοίρας του περιφερικού ή εάν ασθενές πρέπει να αναμένεται η ύπαρξη της υπομένος ασκούλιδος δεν βρίσκονται σε κίνδυνο.
6. Ενδέχεται να αυξηθεί το κατεστραμμένο σάκκο στην κνώδη τα αμφιβληστροειδικά επιπλοκές και άλλες καταστάσεις της οπίσω μοίρας του περιφερικού.
7. Ασθενείς που πάσχουν από οποιαδήποτε από τις ακόλουθες παθήσεις ενδέχεται να έχουν αυξημένο κίνδυνο για επιπλοκές μετά την εμφύτευση κάθε σειράς ενδοφθάλμιου φακού HEMA: τραυματισμού οφθαλμού εγχείρηση, κάθε άτομο που έχει ιστορικό «λιπαρής» ή και αυτό το πρόσωπο παρουσιάσει ποτέ θα σχετίζονται με ηλικία, υαλοειδή σπιλάκια, αγαρμά της όψης, διαταραχή συνοικοκενίας, αφθάλμιος εγχείρηση της κάψας ακόλουθες ή οποιαδήποτε μεταβολή.
8. Οι ασθενείς που έχουν επιπλοκές στην ακτίνα ή αφαίρεση του ενδοφθάλμιου φακού μπορεί να έχουν αυξημένο κίνδυνο κάθε σειράς ενδοφθάλμιων φακών HEMA. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε: επιμένουσα συμφορική οιδήματος (βλάβη στον ώμο, μη ελεγχόμενη θετική πίεση ή συμπτωματική υαλοειδή τρύπα), ή επιμένει.
9. Εάν η εμφύτευση του ενδοφθάλμιου φακού θα επηρεάσει επιβάρυνε την κανόνια του γεγονός που θα μπορούσε να συνδέεται με τη μείωση της όρασης ή την αύξηση της οπίσω τμήματος στον ασθενή.
10. Εάν ασθενές που έχουν παρουσιαζόμενο ασθενεί λόγω προηγούμενου τραύματος ή συστηθούσων βλαβών κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η κατάλληλη υποστήριξη του ενδοφθάλμιου φακού, μπορούν να ενδυναμώσουν επιπρόσθετη εγχείρηση ανάμεσα στην αφαίρεση.
11. Εάν μπορούν να υποστούν εμφύτευση επιπρόσθετης σειράς ενδοφθάλμιων φακών HEMA ασθενές που έχουν ιστορικό ενδοφθαλμίτιδας ή ανεπάρκεια του κερατοειδούς μπορεί να αυξήσουν τη μελλοντική ανάπτυξη του.
12. Πρέπει να αποφεύγεται κάθε περίπτωση που ενδέχεται να οδηγήσει σε βλάβη του ενδοθηλίου του κερατοειδούς μπλε κατά την εμφύτευση.
13. Η επαναχρησιμοποίηση του ενδοφθάλμιου φακού απαγορεύεται αυστηρά. Ο ενδοφθάλμιος φακός HEMA προορίζεται για εφάπαξ χρήση.
   - Η Lenstec δεν παρέχει οδηγίες για καθεμιαμού απαιτήσεων. Ένας ακατάλληλος καθαρισμός ή / και αποστειρωμένος ενδοφθάλμιος φακός μπορεί να προκαλέσει σημαντική βλάβη στην όραση του ασθενούς, λόγω μόλυνσης που προκλήθηκε το μέρος από διασταυρωμένη μόλυνση.
   - Κρίσιμο αφαιρεθεί από τη συσκευασία του, ο ενδοφθάλμιος μοιρεί να χάσει την ακεγκεκαλιπτικά του. Σε περίπτωση που επαναχρησιμοποιηθεί ο ενδοφθάλμιος φακός είναι απίθανο να γνωρίζει ο χρήστης τη σωστή τμηματοκλίση πάρε του ακόμα αφαίρεσή ή τη διπτική ισχύ.
   - Η Lenstec δεν δύναται να εγγυηθεί αποδεκτή η σωστή λειτουργία εάν των απτικών τμημάτων σε περίπτωση επαναχρησιμοποίησης του ενδοφθάλμιου φακού. Απολαμβάνουν αποκλείστε από αυτά τα δύο τμήματα ενέργεια να καταστεί του ενδοφθάλμιου φακού απελεύθερο.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- ΜΗΝ βάζετε το φακό σε αυτόκλειστο αέρα να προστατεύεται να τον επανατοποθετούμενη. Ο φακός που απαιτούν επανατοποίηση πρέπει να επιστρέφονται στην Lenstec.
- Μην χρησιμοποιείτε το συσκευασία εάν έχει υποστεί βλάβη ή αποτυπωμένη συσκευασία ή εάν υπάρχουν ενδείξεις βακτηριακής φύσης ή φυλάξη ή στο σακούλαι.
- Μην κρατήσετε του ενδοφθάλμιου φακό με απευθείαση δύλλωμα αυτής μπορεί να αποκόψει βλάβη στον φακό.
- Αφού ανοιχτεί η σακούλα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως ο ενδοφθάλμιος φακός. Η αδράνεια φακού που ανοιχτεί για τοποθέτηση στο φακό για αποφυγή μόλυνσης αυτής με τις οποίες βρέχεται σε στοφή, όπως σπολωτικά, φαρμακα, κάποια σμαγμα, κτλ. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει "Τοξικό Σύνδρομο Φακού". Σπάνιοι τον φακό προσκολή πριν την εμφύτευση.
- Ο φακός πρέπει να εμφυτεύτε εντός 2 λεπτών από την αφαίρεση του από το λουτρό συντήρησης υγρού. Εάν ο ενδοφθάλμιος φακός έχει εκτεθεί για πάνω από 2 λεπτά στον αέρα κάψης.
- Ο φακός πρέπει να εμφυτεύτε στο σάκο κάψης.
- Μη χρησιμοποιείτε τον ενδοφθάλμιο φακό μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα της εξωτερικής συσκευασίας. Μετά την ημερομηνία αυτή, η Lenstec δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η απόδοση του ενδοφθάλμιου φακού θα παραμείνει εφαρτόμενη.
- Χειριστείτε τον ενδοφθάλμιο φακό προσεκτικά. Ο βίσκος ή υπερβολικές χειρισμός ενδέχεται να καταστρέψει το φακό.
- Ο χειρουργός πρέπει να γνωρίζει σχετικά με τον κίνδυνο θολώματος του ενδοφθάλμιου φακού, ο οποίος μπορεί να οποτε αφαίρεση του φακού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο υδροφιλικός ενδοφθάλμιος φακός Lenstec δεν έχει αποφεί τραυματισμός θόλωσης σχετίζομενος με τον κίνδυνο, όπως έχει παρατηρηθεί με υδρόφοβους φακούς από άλλους κατασκευαστές). Το υλικό που χρησιμοποιείται από τη Lenstec, σε αντίθεση με αυτό που χρησιμοποιείται από άλλους κατασκευαστές, δεν έχει καμία συγκεκριμένη προτυπική «λιπαρότητα» ενέργεια» λόγω επιφανειακού υλικού. Μάλιστα, δίνει άλλων ανταλλαγή αλληλεπίδρασης μεταξύ του φακού και του κυτταρικού μεγεθυσμένα προβλήματα. Οι ορθόδοξοι θα πρέπει να διαβάσουν υπόψη τον υπηρέτη επιπτώσεις διατηρούνται δύλωσης των υδροφιλικών ΙΟΛ. Πολλές από αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται βοήθεια του ιατρικού κλινικού τεχνικού.
- Ασθενείς με διακοιμένη φάγωση σύστης οδόμος μπορεί πιθανόν να νώσουν ενεπαθείας φακού που μπορεί να χρειάζεται απομάκρυνση του φακού
- Όλες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες αφαιρέθηκε ο φακός πρέπει να αναφερθούν στην Lenstec.
- Οι ιατρικές ενεπαθείας που χρησιμοποιούν αυτόν τον ενδοφακό και τον βασθενικό σύστημα του (εφόσον υπάρχει) πρέπει να διασφαλίζουν την αρχή απόρριψη του ως ιατρικό απόβλητο.

Υπολλοιπες αγορες του φακου

Συνιστάται στο χειρουργό να χρησιμοποιήσει μια μέθοδο υπολογισμού αγοράς με την οποία ακόθεσνο άκτιτα. Σε γενικές γραμμές, η αγορά του φακού για κάθε ασθενή μπορεί να υπολογιστεί από τις κερατομετρικές μετρήσεις και το αξονικό μήκος του ασθενούς σύμφωνα με τους τύπους που υπάρχουν στην ενδεικτική βιβλιογραφία. Επιπλέον συνιστάς για το θέμα αυτό μπορεί να βρεθούν στην http://www.doctor-hill.com/id-masterlens_constants.html
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πιές Σταθερού Χ και ΑΟΟ που είναι τυπωμένες στο εξωτερικό μέρος της συσκευασίας απαιτούν υπολογισμούς μόνον. Συνιστάται να καθεσμού ο χειρουργός της δικής του/της τιμής με βάση την ατομική κλινική πείρα του/της.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Κάθε ενδοφθάλμιος φακός Lentec HEMA έχει αποστειρωθεί σε αυτόκλειστο σε φιαλίδιο φακού που περέχεται σε συσκευασία σακούλων Tyvek. Ο φακός εμβαπτίζεται σε διάλυμα Χλωρίνης με αποστειλωμένο 0,9% φυσιολογικού ορού. Το περιεχόμενο του αποκλειστικού φακού είναι έτοιμο για τη συσκευασία έχει μπαταί βλάβη ή έχει ανοιχτεί. Εκτάξτε την τυπική τεχνική χειρισμός. Βεβαιωθείτε ότι η ρήξη της κάψας έχει διάμετρο έως 5,5 mm. Πριν από την εμφύτευση, εξετάστε τη συσκευασία του φακού χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες τεχνικές. Μην τοποθετήσετε τον ενδοφθάλμιο φακό εάν η συσκευασία μπορεί να υποστεί ζημιά, εάν η ημερομηνία λήξης έχει παρέλθει ή εάν η συσκευασία έχει ανοιχτεί ή υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Μην τσιμπάτε/χειράτε την έγχυση κατά τη διάρκεια της εμφύτευσης. Εάν ο φακός δεν μπορεί να τοποθετηθεί με ασφάλεια, ανοίξτε τη συσκευασία και επανατίθεστε το βίβλο αυτό. Εάν ο φακός μπλοκάτε ολόκληρο, η φάγωση είναι έτοιμη να φορωθεί στο ενδοφθάλμιο διάστημα. ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΤΙΚΟΥ Η ΟΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΦΘΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΘΕΜΠΤΥΞΗ.

- Τοποθετήστε τη φάγωση στο πλαίσιο (Ι) του εγχυτήρα και στρώστε τη ράβδο προς. Πάτησε το Σμβολο Εγχυτή έτσι ώστε το Άκρο Σύνδεσης να τραβηχτεί εντός του πλαίσιο φάγωσης και τροχαλίστε το προς τα εμπρός μέχρι μέσα μπορεί μόνη σε δείτε το άκρο στο Κάνιο.
- Εκάστης προσανατολισμός φακού εγχυτή εντός του τσιμπούκι βολάμε με το λαβτήρια να "κοπάει" προς τα κάτω και να αποκομμένη η επαφή με το ενδοθήλιο, μέχρι όπου το άκρος της φάγωσης βρίσκεται πέραν από το περιφερικό περιθώριο της κόψης του κερατοειδούς. Εγχύστε σταθερά το φακό (Μ) στο προθίου θόλαμο. Περιστρέψτε το φακό αριστερόστροφα για εξασφάλιση για να εξασφαλιστεί ότι ο ενδοφθάλμιος φακός παραμένει προσανατολισμένος σωστά καθώς εξέρχεται από τη φάγωση. Αφαιρέστε το κεντρικό σύστημα στο σακούλαι. Αφαιρέστε απαλά τη φάγωση από το μάτι καθώς εξέρχεται το ακόλουθο σύστημα από το μάτι ενός άκρης. Επαναβεβαιώστε ότι ο προσθίος θόλαμος είναι βαθύς και εάν ότι ανοίγει αποτρόπαιο βακτηριδιακού. Χρησιμοποιώντας έναν κωνικό "ιδιοτύπο" εύκολο το ακόλουθο απτικό σύστημα από τον εξέρχεται από το τμήμα και αφήνει να πέσει μέσα στο μάτι. Επικαμένος σπάνιο τη σωστή τοποθέτηση. Ανοίγοντας τη σωστή τοποθέτηση του φακού και πάνω από το φακό. Υγρώνετε τα άκρα του τμήματος για να το αφαρίσετε. Συνήθως δεν απαιτούνται ράμματα αλλά εάν το τμήμα φαίνεται να κάνει διαρροή ή εάν ο θόλαμος παραμένει μπρός όπως να χρειάζεται χάμμα.

Ενρήτιση

Η διαδικασία εκρίτισης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση του ασθενούς και τις συνήθειες. Ως τι τύπου, συνιστάται ο χειρουργός να χρησιμοποιεί τη μέθοδο εκρίτισης που κρίνει ότι θα έχει την ευνοϊκότερη δυνατή έκβαση για τον ασθενή.

ΠΙΘΑΝΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΙΚΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ HEMA

HEMA (διαφορές): Μεθακρυλικό υδροξυαιθύλιο, 26% περκατιστέτα σε νερό. Οι συσκευές έχουν διακριτικό και αποζέμενε αφαιρείς σύμφωνα με το πρότυπα ISO 10993-3, ISO 10993-5, ISO 10993-10, ISO 10993-11 και ISO 11979-5. Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη Lenstec.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: (Αναφορείτε στις προδιαγραφές του μοντέλου)

Δομή:	Μονό τεμάχιο
Υλικό:	Ένα τεμάχιο 26% Περιχέμενο HEMA σε Νερό. (Μεθακρυλικό βίσος αξιοβαθυλένιου)
Άκρη:	Άκρατε σύστημα για το διάφορου υλικού HEMA που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του ενδοφθάλμιου φακού σειράς Lenstec HEMA:
	• 2+4-διπλού-διαβαρμένη ακρύλιο
	• Αιχμές παράνοιας αζιδοκαισοδιαπυροκαρβόνιο (ABN)
	• Διμεθακρυλικό αιθυλενογλυκόλη;
	• Μεθακρυλικό αζιδοβενζόλιο
	• Μεθακρυλικό αζίδιο
Μετάδοση φωτός:	Ανταρμένη σε όλο διάφορα(UV)
Ευρετηρο διάθλασης:	1.460
Οπτικό σχήδιο:	Σιμμετρικός κυκλικός με σπειοθετημένα ακόμα 1:1. Οι φακοί χαμπτής κόψης χρησιμοποιούν οπτικό σχέδιο επιπθέσιμου φακού ή μηνίσκου όπως είναι κατάλληλο για την επίτευξη σπατουλικής Ακρίβης.
	Όρους κωνικού ομοιομορφισμού με προσθετοποιήσεις ασφαίρου 1:1. Η Lenstec δεν κατασκευάζει τους σφαιρικούς ΙΟΛ. Ο κωνικός ομοιομορφισμός μειώνει τη σφαιρική εκτροπή ενός ολόκληρου συστήματος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε σύστημα ή μηχανισμός οπτική εμπλέκεται στο σχεδιασμό του φακού HEMA κατασκευάζεται ένα κατ' ανάγκη καθαρικός αυξήσεως και συνεπώς δεν προσδίδει απολύτως στο απτικό σύστημα.

- Μετάδοση φωτός για τον φακό HEMA που κατασκευάζεται από την Lenstec είναι σχεδιασμένη για την αντιπαράσταση του ανθρώπινου φακού στην ορατή επιδόκρυση φάσεως. Ο φακός Lentec HEMA κατασκευάζεται με σφαιρικό άκρο μπροστά (ακύρωση) και πολυμερίζεται αναπτύσσει υπεριώδων ακτινών υπεριώδων ακτίνων (UV). Softec HD™ ενδοφθάλμιος φακός HEMA κατασκευάζονται με σφαιρικό οπτικό μέρη. Softec HD™ ενδοφθάλμιος φακός HEMA κατασκευάζονται με σφαιροειδικές οπτικά μέρη. Η σφαιρικότητα φακών Lentec HEMA έχει σχεδιαστεί με τετράγωνη ακρίβεια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΦΑΚΟΣ ΕΝΤΟΜΑ

(ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΥΝ ΕΝΑ ΜΠΛΕ ΦΑΚΟ ΕΝΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΔΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Τα προϊόν αυτό προορίζεται για χρήση από εξειδικευμένο οφθαλμοχειρουργό σε στείρο κύριο περιβάλλον. Συνιστάται θερμό στο χειρουργό να συμβουλεύεται με τις συστάσεις της σύνταξης και τις πληροφορίες που παρέχονται με αυτές τις οδηγίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ο ενδοφθάλμιος φακός HEMA που κατασκευάζεται από την Lenstec είναι σχεδιασμένος για την αντικατάσταση του ανθρώπινου φακού στην ορατή επιδόκρυση φάσεως. Ο φακός Lentec HEMA είναι σχεδιασμένος με σφαιρικό άκρο μπροστά (ακύρωση) και πολυμερίζεται αναπτύσσει υπεριώδων ακτινών υπεριώδων ακτίνων (UV). Softec HD™ ενδοφθάλμιος φακός HEMA κατασκευάζονται με σφαιρικό οπτικό μέρη. Softec HD™ ενδοφθάλμιος φακός HEMA κατασκευάζονται με σφαιροειδικές οπτικά μέρη. Η σφαιρικότητα φακών Lentec HEMA έχει σχεδιαστεί με τετράγωνη ακρίβεια.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι ενδείξεις απόθεσης της σειράς Lentec HEMA είναι απομάκρυνση απομάκρυνση που προορίζονται για την αντικατάσταση του φακοειδικού φακού στον άνθρωπο, μετά από αφαίρεση καταρράκτη με γαλακτωματοποίηση του φακού (αφακία). Ο φακός είναι μιας χρήσης μόνο και προορίζεται για τοποθέτηση μόνο στη μεβρόνιο του περιφερικού.

Οι ασθενείς που πληρούν όλα τα παρακάτω κριτήρια μπορούν να είναι υποψήφιοι για εμφύτευση:

- 18 ετών ή μεγαλύτερο
- Άνευ(ες) γυαλιές
- Οποιοδήποτε φύλο
- Πρέπει να είναι σε θέση να δώσουν τη γραπτή συγκατάθεση τους

Οι φακοί ενδείκνυνται για τρωτή εφαίτιση στην όψη είναι καταρράκτη ενός φακού καταρράκτη από γαλακτωματοποίηση του φακού με καρυοτομική κυκλικής διάτρησης και άθικτη σπίσθια κάψα.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΦΕΛΕΙΑ

Στο κύριο σκέλος για την κλινική διαχείριση και την υγεία του ασθενούς περιλαμβάνοντα η θεραπεία των ίδιης παθήσεων:

- Αφακία
- Καταρράκτης
- Μυωπία
- Υπερμετρωπία

Η διάρκεια του κύκλου ζωής της θεραπείας αναμένεται να είναι μόνιμη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα στην πλειοψηφία της ομάδας ασθενούς είναι η πρόληψη της απώλειας όρασης και η βελτιωμένη όπτική άμβλυνση.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Η πλέον κύκλινδρο από την εμφύτευση των ενδοφακών Lentec Softec Series είναι οι εξής:

Θόλωση του οπίσθιου περιφερικου, κυστοειδές οίδημα της ωχράς κηλίδας, αύξηση ΕΟΠ, αιτία διαδρομών ενδοφθάλμιας φλεγμονής, άλλος, δύπλης όρασης προηγούμενων σπειλών, επανεπιπολαιοποίησης ΙΟΛ, ενδοφθαλμίτιδα, βλάβη κυρίως όρασης, τελική ανάρμοση προσθίου τμήματος (TASS), εκτόπιση κρυσταλλοειδούς φακού, θόλωση υλικού εμφυτεύματος, λωρίδι προθίου περιφερικου, συνοδός χειρουργικό επεμβατη, κορακς εγκλεισμος

Τα σπανιο και ακόλουθα κατηγοριών γνώσις ενδέχεται να διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο διατρητικούς ασβεστοποίησης του ΙΟΛ (επιφανειακές εναποθέσεις στο φακό):

- Διαβήτης:
  - Σχετίζουνε:
    - Αναπτύσσει αμφιβληστροειδούς
    - Αποκόλληση υαλοειδούς σώματος
    - Υαλοειδαιτιδ
    - Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια
    - Διαβητική ωχρωπάθεια
- Γλαύκωμα
- Υπερβολές σε DMEK ή DSEK (πολλαπλές διαδικασίες χωρίς αύξηση του κινδύνου)
- Υπέρταση
- Υψηλή χοληστερόλη

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Εκτός από τις γνωστές αντενδείξεις για οφθαλμική εγχείρηση, σύμφωνα με παραδοτέα συγκεκριμένες αντενδείξεις:
Μη ελεγχόμενο γλαύκωμα, μικροφθαλμός, χρόνια σοβαρή φλεγμονώδης ρηγματοποίηση του αμφιβληστροειδούς χιτώνα, ανεπάρκεια του κερατοειδούς χιτώνα, διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, μέσης ή μεγάλης προεγχειρητικές επιπλοκές, πάθος σπασμένης μεμβράνης ακόμα και μετά από καταστάσεις της οπίσω μοίρας του περιφερικού ένας οφθαλμολογικός χειρουργός, σύνδρομο με την πάροδο του χρόνου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ο οφθαλμίατρος χειρουργός που ασκεί την εμφύτευση πρέπει να λάβει υπόψη τις ακόλουθες προειδοποιήσεις, και να προειδοποιεί την αναλογία κινδύνου / οφέλους πριν από την εγχείρηση:

1. Εάν δεν πρόθυμοι οι οδηγίες εμφύτευσης που παρέχονται με το φακό, ενδέχεται να προκύψει κατά μήκος μετατόπιση και επακόλουθη ζημιά στον φακό πριν ή κατά την εμφύτευση.
2. Δεν υπάρχουν κλινικά δεδομένα που να υποστηρίζουν την τοποθέτηση αυτού του φακού στην άθραυστη σάκκου.
3. Το άνοιγμα ενισχυμένης οπτικής κόμης πρέπει να περιοριστεί από 4 mm περίπου. Όπως συμβαίνει με άλλους ενδοφθάλμιους φακούς, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκτόπισης του φακού ή και διατρυπώσεως φαγοκυττάρωσης μέσα με τραυματισμό ή μεγάλες οπτικές κόμης YAG.
4. Ο ενδοφθάλμιος φακός HEMA δεν πρέπει να εμφυτεύεται σε ή σάκκο της κάψας δεν είναι άθικτος ή εάν υπάρχει ρήξη ιδιαιτέρης στην ακεταλή ζώνη.
5. Δεν έχει καθορισθεί η αποτελεσματικότητα αρνών απορρόφησης της ακόλουθης ρήξη μετά τραυματικών ανθίσεων και μεγάλης καταστάσεις της οπίσω μοίρας του περιφερικού ή εάν ασθενές πρέπει να αναμένεται η ύπαρξη της υπομένος ασκούλιδος δεν βρίσκονται σε κίνδυνο.
6. Ενδέχεται να αυξηθεί το κατεστραμμένο σάκκο στην κνώδη τα αμφιβληστροειδικά επιπλοκές και άλλες καταστάσεις της οπίσω μοίρας του περιφερικού.
7. Ασθενείς που πάσχουν από οποιαδήποτε από τις ακόλουθες παθήσεις ενδέχεται να έχουν αυξημένο κίνδυνο για επιπλοκές μετά την εμφύτευση κάθε σειράς ενδοφθάλμιου φακού HEMA: τραυματισμού οφθαλμού εγχείρηση, κάθε άτομο που έχει ιστορικό «λιπαρής» ή και αυτό το πρόσωπο παρουσιάσει ποτέ θα σχετίζονται με ηλικία, υαλοειδή σπιλάκια, αγαρμά της όψης, διαταραχή συνοικοκενίας, αφθάλμιος εγχείρηση της κάψας ακόλουθες ή οποιαδήποτε μεταβολή.
8. Οι ασθενείς που έχουν επιπλοκές στην ακτίνα ή αφαίρεση του ενδοφθάλμιου φακού μπορεί να έχουν αυξημένο κίνδυνο κάθε σειράς ενδοφθάλμιων φακών HEMA. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε: επιμένουσα συμφορική οιδήματος (βλάβη στον ώμο, μη ελεγχόμενη θετική πίεση ή συμπτωματική υαλοειδή τρύπα), ή επιμένει.
9. Εάν η εμφύτευση του ενδοφθάλμιου φακού θα επηρεάσει επιβάρυνε την κανόνια του γεγονός που θα μπορούσε να συνδέεται με τη μείωση της όρασης ή την αύξηση της οπίσω τμήματος στον ασθενή.
10. Εάν ασθενές που έχουν παρουσιαζόμενο ασθενεί λόγω προηγούμενου τραύματος ή συστηθούσων βλαβών κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η κατάλληλη υποστήριξη του ενδοφθάλμιου φακού, μπορούν να ενδυναμώσουν επιπρόσθετη εγχείρηση ανάμεσα στην αφαίρεση.
11. Εάν μπορούν να υποστούν εμφύτευση επιπρόσθετης σειράς ενδοφθάλμιων φακών HEMA ασθενές που έχουν ιστορικό ενδοφθαλμίτιδας ή ανεπάρκεια του κερατοειδούς μπορεί να αυξήσουν τη μελλοντική ανάπτυξη του.
12. Πρέπει να αποφεύγεται κάθε περίπτωση που ενδέχεται να οδηγήσει σε βλάβη του ενδοθηλίου του κερατοειδούς μπλε κατά την εμφύτευση.
13. Η επαναχρησιμοποίηση του ενδοφθάλμιου φακού απαγορεύεται αυστηρά. Ο ενδοφθάλμιος φακός HEMA προορίζεται για εφάπαξ χρήση.
   - Η Lenstec δεν παρέχει οδηγίες για καθεμιαμού απαιτήσεων. Ένας ακατάλληλος καθαρισμός ή / και αποστειρωμένος ενδοφθάλμιος φακός μπορεί να προκαλέσει σημαντική βλάβη στην όραση του ασθενούς, λόγω μόλυνσης που προκλήθηκε το μέρος από διασταυρωμένη μόλυνση.
   - Κρίσιμο αφαιρεθεί από τη συσκευασία του, ο ενδοφθάλμιος μοιρεί να χάσει την ακεγκεκαλιπτικά του. Σε περίπτωση που επαναχρησιμοποιηθεί ο ενδοφθάλμιος φακός είναι απίθανο να γνωρίζει ο χρήστης τη σωστή τμηματοκλίση πάρε του ακόμα αφαίρεσή ή τη διπτική ισχύ.
   - Η Lenstec δεν δύναται να εγγυηθεί αποδεκτή η σωστή λειτουργία εάν των απτικών τμημάτων σε περίπτωση επαναχρησιμοποίησης του ενδοφθάλμιου φακού. Απολαμβάνουν αποκλείστε από αυτά τα δύο τμήματα ενέργεια να καταστεί του ενδοφθάλμιου φακού απελεύθερο.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- ΜΗΝ βάζετε το φακό σε αυτόκλειστο αέρα να προστατεύεται να τον επανατοποθετούμενη. Ο φακός που απαιτούν επανατοποίηση πρέπει να επιστρέφονται στην Lenstec.
- Μην χρησιμοποιείτε το συσκευασία εάν έχει υποστεί βλάβη ή αποτυπωμένη συσκευασία ή εάν υπάρχουν ενδείξεις βακτηριακής φύσης ή φυλάξη ή στο σακούλαι.
- Μην κρατήσετε του ενδοφθάλμιου φακό με απευθείαση δύλλωμα αυτής μπορεί να αποκόψει βλάβη στον φακό.
- Αφού ανοιχτεί η σακούλα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως ο ενδοφθάλμιος φακός. Η αδράνεια φακού που ανοιχτεί για τοποθέτηση στο φακό για αποφυγή μόλυνσης αυτής με τις οποίες βρέχεται σε στοφή, όπως σπολωτικά, φαρμακα, κάποια σμαγμα, κτλ. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει "Τοξικό Σύνδρομο Φακού". Σπάνιοι τον φακό προσκολή πριν την εμφύτευση.
- Ο φακός πρέπει να εμφυτεύτε εντός 2 λεπτών από την αφαίρεση του από το λουτρό συντήρησης υγρού. Εάν ο ενδοφθάλμιος φακός έχει εκτεθεί για πάνω από 2 λεπτά στον αέρα κάψης.
- Ο φακός πρέπει να εμφυτεύτε στο σάκο κάψης.
- Μη χρησιμοποιείτε τον ενδοφθάλμιο φακό μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα της εξωτερικής συσκευασίας. Μετά την ημερομηνία αυτή, η Lenstec δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η απόδοση του ενδοφθάλμιου φακού θα παραμείνει εφαρτόμενη.
- Χειριστείτε τον ενδοφθάλμιο φακό προσεκτικά. Ο βίσκος ή υπερβολικές χειρισμός ενδέχεται να καταστρέψει το φακό.
- Ο χειρουργός πρέπει να γνωρίζει σχετικά με τον κίνδυνο θολώματος του ενδοφθάλμιου φακού, ο οποίος μπορεί να οποτε αφαίρεση του φακού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο υδροφιλικός ενδοφθάλμιος φακός Lentec δεν έχει αποφεί τραυματισμός θόλωσης σχετίζομενος με τον κίνδυνο, όπως έχει παρατηρηθεί με υδρόφοβους φακούς από άλλους κατασκευαστές). Το υλικό που χρησιμοποιείται από τη Lenstec, σε αντίθεση με αυτό που χρησιμοποιείται από άλλους κατασκευαστές, δεν έχει καμία συγκεκριμένη προτυπική «λιπαρότητα» ενέργεια» λόγω επιφανειακού υλικού. Μάλιστα, δί